

Wat moet ik weten over Rivaroxaban

- Rivaroxaban verdunt het bloed, wat voorkomt dat u gevaarlijke bloedstolsels krijgt.
- Rivaroxaban moet precies worden ingenomen zoals voorgeschreven door uw arts. Voor een optimale bescherming tegen bloedstolsels **mag u geen enkele dosis overslaan.**
- Stop niet met het innemen van Rivaroxaban zonder eerst met uw arts te overleggen omdat u anders een groter risico loopt op het krijgen van bloedstolsels.

- Vertel het uw zorgverlener als u nog andere geneesmiddelen gebruikt, dat kort geleden heeft gedaan of van plan bent te gaan doen, voordat u met Rivaroxaban begint.
- Vertel uw zorgverlener dat u Rivaroxaban gebruikt voordat u een operatie of een procedure ondergaat waarbij het lichaam wordt binnengegaan.

Wanneer moet ik mijn zorgverlener raadplegen?

Bij inname van een bloedverdunner, zoals Rivaroxaban, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de mogelijke bijwerkingen ervan. Een bloeding is de meest voorkomende bijwerking. Een bloeding is de meest voorkomende bijwerking.

Als u weet dat u een risico op bloedingen hebt, start dan niet met de inname van Rivaroxaban zonder dit eerst met uw arts te hebben besproken.

Vertel het uw zorgverlener direct als u klachten of symptomen van bloedingen heeft, zoals de volgende:

- pijn
- zwelling of ongemak
- hoofdpijn, duizeligheid of zwakte
- ongebruikelijke blauwe plekken,
- bloedneus, bloeding van tandvlees,
- snijwondjes die lang blijven bloeden
- menstruatie of vaginale bloeding die heviger is dan gewoonlijk

- bloed in uw urine waardoor die roze of bruin kan zijn, rode of zwarte stoelgang
- bloed ophoesten, of braken van bloed of materiaal dat de kleur heeft van koffiedik.

Hoe moet ik Rivaroxaban innemen?

- Voor een optimale bescherming moet Rivaroxaban als volgt worden ingenomen:
 - 2,5 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen
 - 10 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen
 - 15 mg moet met voedsel worden ingenomen
 - 20 mg moet met voedsel worden ingenomen.

Rivaroxaban 2.5 mg

Rivaroxaban 10 mg

Rivaroxaban 15 mg

Rivaroxaban 20 mg

- **Draag dit kaartje altijd bij u.**
- **Toon dit kaartje aan elke arts of tandarts voordat een behandeling plaatsvindt.**

Ik word behandeld met het antistollingsmiddel (rivaroxaban)

Naam:

Andere geneesmiddelen/aandoeningen:

Adres:

Geboortedatum:

Gewicht

Waarschuw bij
noodgevallen:

Naam arts:

Telefoon arts:

Stempel arts:

Waarschuw ook:

Naam:

Telefoon:

Relatie:

Informatie voor
zorgverleners:

- INR-waarden mogen niet gebruikt worden, omdat ze geen betrouwbare maat zijn voor de antistollingsactiviteit van rivaroxaban

Local version 12-2022-V.1.1.