

Front



PATIËNTENWAARSCHUWINGSKAART

Dabigatran etexilaat Viatris harde capsules

- U/de verzorger moet deze kaart altijd bij u/zich hebben.
- Zorg ervoor dat u altijd de meest recente versie heeft.

Beste patiënt/verzorger van een patiënt in de kinderleeftijd,

U/uw kind krijgt Dabigatran etexilaat Viatris van de arts. In de bijsluiter staat belangrijke informatie over dit medicijn. Zo kunt u dit medicijn veilig gebruiken.

Het is belangrijk dat u/uw kind deze waarschuwingskaart altijd bij u/zich heeft. Er staat namelijk belangrijke informatie op over uw behandeling/de behandeling van uw kind. Op deze manier weten zorgverleners dat u/uw kind dit medicijn gebruikt.

Dabigatran etexilaat Viatris informatie voor de patiënt/verzorger van een patiënt in de kinderleeftijd

Over uw behandeling/de behandeling van uw kind

- Dit medicijn verdunt het bloed. Het wordt gebruikt om bestaande bloedpropjes te behandelen of om de vorming van gevaarlijke bloedpropjes te voorkomen.
- Houd u aan de instructies van uw arts/de arts van uw kind als u/uw kind dit medicijn gebruikt. Sla nooit een dosis over. Stop ook niet zomaar met het

gebruik van dit medicijn. Overleg altijd eerst met uw arts/de arts van uw kind of u/uw kind met dit middel mag stoppen.

- Vertel uw arts/de arts van uw kind over alle medicijnen die u/uw kind nu gebruikt.
- Krijgt u/uw kind een operatie of een andere ingreep? Vertel uw arts/de arts van uw kind over het gebruik van Dabigatran etexilaat Viatris.
- Dabigatran etexilaat Viatris capsules kunnen bij het eten worden ingenomen, maar dat hoeft niet. U/uw kind moet de capsule heel doorslikken met een glas water. U/uw kind mag de capsule niet breken, openmaken of erop kauwen. U/uw kind mag de bolletjes er niet uithalen.

Wanneer moet u medische hulp inroepen?

- Door gebruik van Dabigatran etexilaat Viatris kan de kans op bloedingen toenemen. Neem direct contact op met uw arts/de arts van uw kind als u/uw kind last krijgt van een van de volgende mogelijke klachten en symptomen van een bloeding, zoals:
 - zwelling
 - ongemak
 - ongewone pijn of hoofdpijn
 - duizelig zijn
 - minder kleur in uw gezicht
 - zwakte
 - ongewone blauwe plekken
 - bloedneus
 - bloedend tandvlees
 - ongewoon lang bloeden na een snijwond

Back

- ongewone menstratiebloedingen of vaginale bloedingen
- bloed in de plas, waardoor de plas roze of bruin van kleur is
- rode/zwarte ontlasting
- ophoesten van bloed
- overgeven van bloed of koffiedikachtig braaksel.
- Als u/uw kind valt of een verwonding oploopt (vooral als u/uw kind het hoofd stoot), roep dan direct medische hulp in.
- Krijgt u/uw kind last van brandend maagzuur, misselijkheid, overgeven, maagklachten, een opgeblazen gevoel of pijn in de bovenbuik? Stop dan niet met het gebruik van Dabigatran etexilaat Viatris zonder met uw arts/de arts van uw kind te overleggen.

Dabigatran etexilaat Viatris informatie voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

- Dabigatran etexilaat Viatris is een oraal antistollingsmiddel (directe trombineremmer).
- Dabigatran etexilaat Viatris moet mogelijk vóór een chirurgische of andere invasieve ingreep worden gestaakt.
- In geval van een grote bloeding moet Dabigatran etexilaat Viatris onmiddellijk worden gestaakt.
- Een specifiek antidotum (idarucizumab) is beschikbaar voor volwassen patiënten. De werkzaamheid en veiligheid van het specifieke antidotum idarucizumab

bij pediatrische patiënten zijn niet vastgesteld.

Voor details en voor meer advies voor het tegengaan van het antistollingseffect van Dabigatran etexilaat Viatris, zie de Samenvatting van de Productkenmerken van Dabigatran etexilaat Viatris en idarucizumab.

- Dabigatran etexilaat Viatris wordt hoofdzakelijk via de nieren uitgescheiden; er moet een adequate urineproductie worden gehandhaafd. Dabigatran etexilaat Viatris is dialyseerbaar.

Vul dit gedeelte in of vraag uw arts/de arts van uw kind om dit voor u/uw kind te doen.

Patiëntgegevens

Naam van de patiënt

Geboortedatum

Indicatie voor de antistolling

Dosis van Dabigatran etexilaat Viatris